



PLUS BAL-NEW



AMINOÁCIDOS DE ORIGEN ANIMAL DE RÁPIDA RESPUESTA.



Nutrición *Sistémica* por Excelencia ...

Aminoácidos libres y péptidos de bajo peso molecular. Producto de carácter orgánico. Su efecto estimulante y vigorizante, mejora la floración, fecundación, cuajado y producción. Aumenta el tamaño de los frutos, su homogeneidad y riqueza en azúcares, aceite, grasas y vitaminas.

Ejerce efecto complejante de micronutrientes y otros nutrientes catiónicos (potasio, calcio, hierro, magnesio, cobre, zinc, manganeso...). Aplicar en épocas de estrés, heladas, sequías, plagas y/o enfermedades.

Cuando es aplicado foliarmente:

- Mejora la absorción, traslocación y eficacia de las aplicaciones foliares.
- Permite disminuir las dosis de los productos aplicados conjuntamente.

Cuando es aplicado vía riego:

- Aumenta la fertilidad biológica y química del suelo.
- Mejora la movilidad de los nutrientes en el suelo.
- Mejora la absorción y traslocación de nutrientes desde las raíces , hasta las partes aéreas de los mismos.

**Sinergizado mediante tecnología TMR.
Efecto adaptogénico**



RIQUEZAS GARANTIZADAS

	P/P
Aminoácidos libres	7,2%
Nitrógeno (N) total	6,3%
Nitrógeno (N) orgánico	6,1%

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Forma de presentación del producto: Líquido.

Concentrado soluble (SL).

Densidad: 1,25 kg/L

pH: 6-7

CLASE A: "Contenido en metales pesados inferiores a los límites autorizados para esta clasificación."

Proceso de obtención de los aminoácidos: hidrólisis ácida de proteínas.

Materias primas de origen orgánica: sustancias proteicas de origen animal 100 %.



CONSECUENCIA DE LA SEQUÍA EN OLIVO




RESULTADO DE HELADAS EN ACEITUNAS



RESULTADO DE HELADAS EN CAQUI



RESULTADO DE HELADAS EN NARANJA



RESULTADO DE HELADAS EN MELOCOTÓN

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Realizar entre 3 y 4 aplicaciones foliares por cultivo y ciclo a las dosis recomendadas.

APLICACIÓN FOLIAR:

Olivos: De 2 a 3 aplicaciones de 200 a 250 ml/100 L repartidas desde floración a engorde.

Frutales, hortícolas y ornamentales: De 200 a 250 ml/100 L. (2-3 L/ha)

Cultivos herbáceos extensivos: De 150 a 200 ml/100 L. (1,5-2 L/ha)

APLICACIÓN VIA RIEGO:

Dosis para fertirrigación:

Olivos: De 3 a 4 aplicaciones de 3-4 L/ha en brotación, floración, cuajado y engorde.

Frutales, hortícolas y ornamentales: De 3 a 4 L/ha y aplicación.

Herbáceos extensivos: De 2,5 a 3 L/ha y aplicación.

En riego por inundación, incrementar la dosis un 20-40 %.

A LA VENTA EN ENVASES DE 1, 5 Y 20 LITROS



FABRICADO EN ESPAÑA

AgroSerna S.L.

Pol. Ind. Mos del Bou, P-14, nº 58
Apartado de correos 147,
03340 ALBATERA (Alicante) España
Tlf. +34 965 487 864 Fax. +34 956 487 866

info@agroserna.es

www.agroserna.com



CONTENIDO NETO
1L/1,25kg
5L/6,25kg
20L/25kg