



W.CALIBOR SYSTEM ACE



SOLUCIÓN DE ACETATO CÁLCICO



El calcio es un macroelemento de poca movilidad en el interior de la planta. Así pues, las deficiencias de calcio durante el crecimiento y fructificación, bien por su bajo contenido en los suelos, bien por problemas de disponibilidad, absorción, movilidad en la planta o asimilación, provocan diversas fisiopatías. La forma complejada del calcio en este producto facilita una rápida absorción, transporte y asimilación del calcio en el interior de la planta. El producto es útil como preventivo y corrector, frente a deficiencias y carencias de calcio, independientemente de su causa. La aplicación de

este producto produce un incremento de la turgencia, dureza, elasticidad y calidad de la piel y del propio fruto.

Algunas de las anomalías que ayuda a prevenir son: clorosis de los bordes de las hojas jóvenes, encorvamiento de los ápices en crecimiento, pudriciones apicales asépticas (aceituna, pimiento, tomate, etc), acorchado de la manzana (bitter pit), la bifurcación de la raíz de la remolacha y zanahoria, tip-burn de lechuga, brócoli, coles y coliflores, rajado de la piel del tomate, cereza y otros frutos, clareta en cítricos etc. **Contiene nuestra Tecnología CCEON^(MS).**

Nutrición *Sistémica* por Excelencia ...



RIQUEZAS GARANTIZADAS

	P/P
Óxido de calcio (CaO) soluble en agua	8,0%

Contiene aniones acetato.

Contiene calcio procedente de acetato de calcio.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS


Tipo de formulado: Solución líquida.

Concentrado soluble (SL).

Solubilidad en agua: 100 %.

Densidad: 1,3 kg/L.

pH: 3-4.



**RAJADOS DE PIEL
POR DEFICIENCIA
DE CALCIO**



**DEFICIENCIA DE
CALCIO EN
MANZANA**



DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

CALIBOR SYSTEM ACE se puede utilizar en aplicación foliar, radicular o simultáneamente.

VIA FOLIAR:

Realizar en todos los cultivos 2-4 aplicaciones espaciadas 15-20 días a las siguientes dosis:

- **Cítricos, frutales y hortícolas:** 200/300 ml/100 L. ó 3 a 6 L/ha desde pre-floración.
- **Hortícolas:** 200/300 ml/100 L. ó 3 a 4 L/ha desde pre-floración.
- **Extensivos e industriales:** 1-2 L/ha y aplicación desde los 30-50 días de emergencia y en pre-floración.

FERTIRRIGACIÓN:

Cítricos, Frutales y Hortícolas: de 40 a 80 L/ha y ciclo de cultivo

En inyección directa: entre 25 y 35 ml/m³ de agua.

**DEFICIENCIA
DE CALCIO EN
LIMONES**



FABRICADO EN ESPAÑA

AgroSerna, s.l.

Pol. Ind. Mos del Bou, P-14, nº 58
Apartado de correos 147,
03340 ALBATERA (Alicante) España
Tlf. +34 965 487 864 Fax. +34 956 487 866

info@agroserna.es - vicentegerencia@agroserna.es - www.agroserna.com

**A LA VENTA EN
ENVASES DE 1, 5, 20,
600 y 1000 LITROS**



CONTENIDO NETO
1L/1,3kg
5L/6,5kg
20L/26kg
600L/780kg
1000L/1300kg