



W. MAGIC FILM



PRODUCTO PARA EL TRATAMIENTO DE LA CORTEZA DE TRONCO Y RAMAS. INJERTOS, HERIDAS Y REDUCCIÓN DE LA MULTIYEMA.



Nutrición *Sistémica* por Excelencia ...

Revestimiento impermeabilizante, elástico y transpirable, al agua, fabricado con copolímeros acrílicos, exento de productos asfálticos.

- Secado primera mano: 2 horas.
- Secado para segundas manos: 12 horas.
- Temperatura de aplicación: entre +7°C y +30 °C.
- Rendimiento: De 2,5 a 5 m2 por Litro y mano.

W. MAGIC FILM, posee las siguientes ventajas:

- Inhibe la brotación de la multiyema en cítricos (yemas adventicias): Las variedades multiyema frenan el desarrollo de los plantones, injertos, y reinjertos de todas las especies cítricas. Este producto, reduce este problema al impedir el paso de la luz, evitando la brotación de este tipo de yemas y adventicias.

- Previene la aparición de pudriciones y daños en la epidermis de los árboles injertados y reinjertados sobre casi el 100 % de los patrones existentes en citricultura.
- Cubre heridas o cortes producidos por la poda u otra acción mecánica que constituyen fuente de entrada de patógenos causantes de enfermedades bacterianas

y fúngicas.

- No es fitotóxico y su aplicación contribuye a que la base de los árboles no entre en contacto con tratamientos herbicidas.

- Efecto protector del ataque de roedores sobre la corteza de los troncos.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Densidad: 1,3 kg/L



*FABRICADO EN ESPAÑA

AgroSerna, s.l.

Pol. Ind. Mos del Bou, P-14, nº 58
Apartado de correos 147,
03340 ALBATERA (Alicante) España
Tlf. +34 965 487 864 Fax. +34 956 487 866

info@agroserna.es

www.agroserna.com

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Con el objetivo de obtener un excelente recubrimiento y perdurable en el tiempo, diluir W. MAGIC FILM en agua al 10 % como máximo y aplicar directamente con brocha apropiada sobre la superficie a proteger hasta que se consiga una cubrición perfecta.

W. MAGIC FILM se puede emplear en cualquier momento del año, siempre y cuando se aplique antes de la salida de las brotaciones de primavera o verano. Recomendamos pintar dos veces seguidas con intervalo mínimo de 2 horas entre aplicaciones.

En el caso de árboles recién plantados, aplicar una vez el plantón esté arraigado.

En plantaciones establecidas, aplicar inmediatamente antes de observar la emergencia de las multiyemas, pintando desde la base del tronco, hasta la cruz.

En el caso de las reinjertadas:

- a) Aplicar después de que el primer injerto haya alcanzado los primeros 20 cm de longitud.
- b) pintar 5 cm por arriba y por abajo de los injertos, incluso el propio injerto.

**A LA VENTA EN
ENVASES DE 4 Y
15 LITROS**



CONTENIDO NETO
4L/5,2kg
15L/19,5kg